
戦の発生を防ごう

水たまりをなくすのが効果的!





幼虫(ポウフラ)

蚊の一生

or a facility of

卵は2~3日でふ化し、ボ ウフラになり7~10日ほ どかけて、サナギになり ます。そして2~3日後に 成虫になります。


つまり、週に一度水たまりをなくせばいいのです!

erzentek 🕶 an irek

発生原因

チェックリストです。発生源を探してみましょう。






_**」●古タイヤ** 捨てるか水抜き穴をあける。



●植木鉢の受け皿庭先やペランダに注意。水がたまったままにしない。



___ ●ビニールシート たるみをなくす。



●バケツ・ジョウロ 水をためておかない。 裏返して躓くと良い。



」**●放置容器** 不要なものは捨てる。 汲み置き水に注意。

- ★蚊に対して殺虫剤を散布することは、一時的に効果はありますが長続きしません。殺虫剤はあくまでも補助的に使用し、使いすぎに気をつけましょう。
- ★蚊に刺されないようにするために、網戸の使用や、蚊の発生しやすい場所では、なるべく長袖長ズボンを着用しましょう。場合によっては虫除けスプレーや蚊取り線香を利用しましょう。虫除けスプレーを小児に使用する場合は、取扱説明書に従ってください。
- ★蚊は行動範囲が広いため、対策を地域全体で行うことが大切です。ご近所で声をかけ合い、蚊の発生場所をなくしましょう。